

## SAĞLIK ÇALIŞANLARI ve HASTALAR İÇİN GÜVENLİKTE YENİ STANDART

Tedaviyi uygulamak için standart prosedürü kullanınız.

Enjektörü kurumunuzun politikasına uygun olan aseptik teknigi ile hazırlayınız ve enjekte ediniz.

İğne, hastanın içindeyken pistona basarak geri çekme mekanizmasını harekete geçiriniz.

VanishPoint enjektörü uygun olan tıbbi atık kovasına atınız.

Güvenli bir şekilde iğneyi kan alma tüp tutucusuna takınız. Kullanmaya hazır olduğunda iğnenin koruyucu kabını çıkarınız.

Kurum protokolüne uygun şekilde damara giriş yapınız.

Kan alma işleminin sonunda son tüpü çıkarıp iğne hala hasta damarının içindeyken tüp tutucusunun arkasındaki kapağı kapatınız.

Kurumun protokolüne göre tüp tutucusunu uygun tıbbi atık kovasına atınız.

Kanın gelişini görerek venipunktür işlemini gerçekleştirin. Kateteri yavaşça damarın içine doğru itin.

Gövdeyi sabit tutarak, giriş iğnesini tanıtıçı piminden ayırin. Kateteri işaret parmağınızla damara doğru ilerletin.

Giriş iğnesini kateterden geri çekmeden, renk kodlu olan pistonun sonuna tam basarak otomatik geri çekme mekanizmasını aktif hale getirin.

Giriş iğnesi, kateterden çıkartılmadan otomatik geri çekilme mekanizması ile iğne yuvasına geri çekilir. İşlem sonunda uygun tıbbi atık kovasına atınız.

